

PDK für operative Eingriffe

Indikationen:

!Bilder und Anhänge/Pasted image 20250709154256.png

Kontraindikationen

!Bilder und Anhänge/Pasted image 20250709154333.png

Vorgehen bei der Anlage des Katheters

- Anlage PDK nach den Regeln der Kunst, einführen bis Marke III am Nadelanfang
- Nadel entfernen Katheter auf HN + 4-5 cm ziehen
- Konnektor anschließen, Aspiration ohne Filter mit 2 ml-Spritze
- gespülten Filter konnektieren, Katheter fixieren und sichern
- fraktionierte (2 ml/3 ml) Gabe von 5 ml vorbereiteter PDK-Mischung (s.u.) als Testdosis
- PDK-Mischung: Ropivacain 0,4 % + Sufentanil 0,5 µg/ml (in 20 ml-Spritze)

Komplikationen bei der Durchführung

!Bilder und Anhänge/Pasted image 20250709154413.png

Intraoperatives Vorgehen

- zunächst fraktionierte Gabe von 5 ml der PDK-Mischung vor Hautschnitt
- wiederholte Gabe von jeweils 8-10 ml nach 1,5 -2 h
- wenn keine ausreichende Wirkung nach RS OA höhere Konzentration oder Opioid

- wenn vorbereitete Mischung aufgebraucht Anschluss Perfusor mit Laufrate 0,1 ml/kg/h und Ropivacain 0,2 % plus Sufentanil 0,5 µg/ml
-

Revision #1

Created 2026-08-16 17:51:32 UTC by Andiadmin

Updated 2026-08-16 17:51:33 UTC by Andiadmin