

postoperative Übelkeit und Erbrechen (PONV)

Risikoscore nach Apfel

Risikofaktor	Punktzahl
weibliches Geschlecht	1
Nichtraucher	1
PONV in Anamnese	1
erwartete postop. Opioidtherapie	1

- 0: ca. 10 %
- 1: ca. 20 %
- 2: ca. 30 %
- 3: ca. 40 %

Eingriffsbezogenes Risiko

Nur für folgende Eingriffe gilt ein erhöhtes Risiko

- laparoskopische Cholezystektomie
- Strabismus-OPs

Therapie

Wirkstoff	Dosierung	Zeitpunkt	Kommentar	Rezeptor
Dexamethason	4 mg	bei Einleitung	Prophylaxe KI: DM II	Glukokortikoid
Granisetron	1-3 mg	Am Ende der OP	Prophylaxe/ Therapie KI: 1. Trimenon der Schwangerschaft	5HT3
Droperidol	0,625-1,25 mg	Am Ende der OP	Prophylaxe/ Therapie KI: Morbus Parkinson	D2

Wirkstoff	Dosierung	Zeitpunkt	Kommentar	Rezeptor
Dimenhydrinat	1 mg/kg (62 mg)	bei weiter bestehendem PONV	Therapie KI: geriatrische Patienten	H1
Die Wirkung von Propofol auf das Auftreten von PONV ist gering und wird meistens überschätzt.				

Revision #1
Created 2026-08-16 17:59:53 UTC by Andiadmin
Updated 2026-08-16 17:59:53 UTC by Andiadmin